

藥物食品交互作用衛教單張

神經、肌肉與精神系統用藥		
藥品學名/臨床用途	交互作用的食物	建議
Barbiturates-phenobarbital(巴比妥類鎮靜劑)	酒	避免飲酒 ：因增強中樞神經抑制作用使運動協調能力變差
Benzodiazepines-alprazolam,bromazepam,brotizolam, clonazepam,diazepam,estazolam,flunitrazepam, lorazepam,midazolam,oxazolam(鎮靜安眠劑)	酒 葡萄柚汁	避免使用 ：因增強中樞神經抑制作用使運動協調能力變差
Biperiden(巴金森氏症與動作障礙治療劑)	檳榔	避免使用 ：因會降低療效
Bupirone(焦慮緩解劑)	葡萄柚汁	避免使用 ：因會增加藥品副作用
Carbamazepine(癲癇與神經痛治療劑)	葡萄柚汁	避免使用 ：因會增加藥品副作用
Clozapine(精神穩定劑)	含咖啡因飲料	避免使用 ：因會增加藥品副作用
Fluvoxamine(情緒改善劑)	葡萄柚汁	避免使用 ：因會增加藥品副作用
Lithium(鋰鹽)	含咖啡因飲料	避免大量使用(每天>4杯) ：會降低鋰鹽濃度需嚴密監測
Phenothiazines-chlorpromazine,fluphenazine, prochlorperazine,trifluoperazine(止吐與精神穩定劑)	酒	避免飲酒 ：因增強中樞神經抑制作用並增加藥品副作用
Trazodone(情緒改善劑)	銀杏	避免使用 ：因會增加藥品副作用導致過度嗜睡
Chlorzoxazone(肌肉鬆弛劑)	西洋菜	避免使用 ：因會增加藥品副作用

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

財團法人基督教門諾會醫院病患用藥教育單張，藥劑科製作 2009/11/24