

麻醉藥品止痛劑 (Narcotic Analgesics)

主成份	商品名	中文商品名	含量
Codeine Phosphate	Codeine Tablet	磷酸可待因錠	30 毫克/錠
Morphine HCl	Morphine Tablet	鹽酸嗎啡錠	10 毫克/錠
Morphine Sulfate	MST Continus Tablet	硫酸嗎啡長效膜衣錠	30 毫克/錠
Buprenorphine HCl	Temgesic Sublingual Tablet	丁基原啡因舌下錠	0.2 毫克/錠
Tramadol hydrochloride	Tramadol Sandoz Uno	治爾疼持續性藥效錠	200 毫克/錠
Tramadol HCl/acetaminophen	Ultracet	及通安錠	37.5 毫克/325 毫克/錠
Propoxyphene HCl/acetaminophen	Tong-Well	痛克惠	32 毫克/325 毫克/錠

作用：

1. 治療中至重度疼痛
2. 治療咳嗽 (codeine)

劑量與用法：

1. 請遵照醫囑，請勿擅自改變藥量或服藥時間。突然停藥可能引發戒斷症狀。
2. 長效錠，如硫酸嗎啡長效膜衣錠 (MST、Morphine SR)、須整粒吞服，不可嚼碎、剝半或磨粉。
3. 丁基原啡因 (Temgesic) 舌下錠不可咀嚼或吞服，否則會影響藥效。

注意事項：

1. 服用此類藥品可能會讓您覺得眩暈或嗜睡，在未確定此類藥品對您有何影響之前，請勿開車或操作危險機械。
2. 避免喝酒精性飲料，酒精會增強此藥造成的鎮靜作用。
3. 有下列情形時，請事先告知醫師：曾對此藥或其它鴉片製劑有過敏反應；正在服用其他藥品（特別是中樞神經抑制劑、阿斯匹靈或其它水楊酸類藥品、抗凝血劑、非類固醇止痛消炎藥、MAO抑制劑、抗組織胺、感冒藥等）；有肺、心、肝、腎、甲狀腺、腸阻塞、攝護腺腫大、排尿問題等方面的病史；懷孕及授乳期。
4. 服藥期間，須進行拔牙或各類手術，應告知醫師正服用此藥。
5. 身體貼有穿皮貼片 (Fentanyl HPQ Transdermal Patch) 的部位，避免直接照射陽光、接觸電毯或熱敷，以免因高溫而增加皮膚對藥品的吸收。
6. 小孩、老人對此類藥品作用比較敏感。

忘記服藥時該怎麼辦？

想起時儘快服用。但如果很接近下次的服藥時間，則跳過一次。照原來時間服用下一次的劑量。絕對不可一次服用雙倍劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
精神混亂、癲癇；血壓降低；瞳孔縮小；心跳變慢；呼吸困難、呼吸變慢	為服藥過量的症狀，請立即至急診處理
心跳變快或不規則、幻覺、皮膚癢、皮疹、呼吸不規則、呼吸急促、肌肉僵硬、顫抖、動作無法控制；臉部紅、腫、癢	請儘速就醫
尿液變深、眼或皮膚變黃、黏泥狀糞便 (propoxyphene)	請儘速就醫
頭痛、激動、虛弱、睡眠障礙、視力模糊或複視、噁心、嘔吐、食慾不振、胃痛、便秘、排尿困難、口乾	請告知醫師，尤其是症狀持續或嚴重時

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

財團法人臺灣基督教門諾會醫院病患用藥教育單張 藥劑科製作 2009/11/24