

保麗娜液/普麗液

主成份及含量	Oleyl alcohol polytar 1% w/w	Polytar 0.25g/g Liquid paraffin 0.35g/g
商品名	Polytar liquid	Polytar Emollient
中文名	“史帝富”保麗娜液	“史帝富”普麗液
包裝	1% 150 mL/瓶	25% 350 mL/瓶

作用

1. 保麗娜液

止頭皮癢、去頭皮屑，可治療炎性疹、乾癬、牛皮癬、濕疹等頭皮疾患。其pH值為5.5，是一種濃縮的抗菌焦油清洗頭皮藥劑。（內含潔髮去污劑，可不必另用洗髮精或肥皂。）

2. 普麗液

可治療牛皮癬、濕疹、搔癢皮膚病。Polytar可去角質、殺菌、止癢。Light liquid paraffin為天然保濕因子，使用後皮膚滑潤不乾澀，兼具清潔、滋潤及治療效果。

用法

►保麗娜液

1. 先用洗髮精清洗過頭髮。
2. 再倒入適量保麗娜液，用量足夠產生豐富之泡沫即可，搓入頭皮稍加按摩並停留5-20分鐘後，再用清水反覆沖洗乾淨。
3. 若頭髮油膩或頭屑過多者可重洗一次，每星期約使用1-2次。

►普麗液

1. 使用前先搖勻，將2-4瓶蓋本藥液倒入浴缸內約8吋(20cm)深的水量中，浸泡15~20分鐘，用毛巾拍乾即可。
2. 或以1:125的比例稀釋藥水直接塗抹於患部，拍乾之。例如：可將10 c.c藥水加入1250 c.c水中混合拌勻後使用。
3. 亦可配合紫外線照射療法 (UV Radiation)或其他療法合併使用。

忘記服藥時該怎麼辦？

想起來的時候，儘快使用。但若已接近下次用藥時間，則不要補用，不須使用雙倍的劑量。

注意事項：

1. 本藥只限外用，避免接觸到眼睛。
2. 用藥前，請先告知您的醫師，您目前正在使用的其它藥物，因為有許多藥會

影響本藥之藥效。

3. 如果您曾經有對本品任何成分過敏(如 Juniper Tar、Pine Tar、Coal Tar、液體石臘)，用藥前請告知您的醫師。
4. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
5. 請勿自行將藥拿給別人吃，以免發生意外。
6. 請儲存於緊密容器，室溫儲存，避免陽光照射或潮溼處(如浴室)，並慎防兒童取用。

儲存方法：

室溫儲存

藥品副作用與處置方法：

雖然副作用是不常見，但仍有可能會發生。

如果您有皮膚刺激現象及耐藥性產生，則停止使用，並請教醫師。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

財團法人臺灣基督教門諾會醫院病患用藥教育單張 藥劑科製作 2009/12/14