

## 普力馬林陰道乳膏

---

**主成份及含量：**Conjugated estrogens 0.0625% 42.5g/每條

**英文商品名：** Premarin vaginal cream

**中文名：**普力馬林陰道乳膏

### 作用：

為陰道乳膏，用於萎縮性陰道炎及更年期性外陰萎縮症。

### 劑量：

一般建議劑量為每天一次，每次 0.5g 使用三個星期，第四週起用法改成每星期兩次，每次 0.5g。

### 用法：

1. 打開軟膏管蓋子。
2. 將管狀送藥器栓緊在軟膏管嘴上。
3. 擠壓軟膏管，使軟膏依所需劑量擠入送藥器內，(如：0.5gm、1.0gm、1.5gm、2.0gm)
4. 再分離送藥器與軟膏管。
5. 先躺下後抬起膝蓋，再將裝有藥膏的送藥器輕輕插入陰道深部，然後推動推管將藥膏完全推入陰道內。
6. 將使用後的塗藥器之推管及容器管分開，以少許肥皂和溫水沖洗、陰乾。

### 忘記服藥時該怎麼辦？

想起來的時候，儘快使用。但若已接近下次服藥時間時，則不要補用，只使用一次劑量即可，千萬不要同時使用雙倍劑量。

### 注意事項：

1. 使用前，請先告知您的醫師，是否對此藥或其它藥品過敏。
2. 使用前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物。
3. 使用前，請告知醫師您是否有其他疾病，如乳癌家族史、血栓疾病、不尋常的陰道出血。
4. 如果您是孕婦、準備懷孕或是哺乳中，請先告知醫師。
5. 請勿自行將藥拿給別人使用，以免發生意外。
6. 請儲存於室溫，並慎防兒童取用。

### 儲存方法：

室溫儲存


**此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？**

1. 如果以下副作用變嚴重或持續存在，請告知您的醫師：陰道搔癢、胃部不適、噁心、腹脹、手腳水腫等。
2. 如果您有以下任何症狀，請立即告知醫師：皮膚發疹、突然嚴重的頭痛或嘔吐、眼睛及皮膚變黃、突然的視力減弱或喪失、暈眩、四肢無力、胸痛、咳血、呼吸困難及不正常的出血。


此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

財團法人臺灣基督教門諾會醫院病患用藥教育單張 藥劑科製作 2009/12/21


# Premarin Vaginal cream 用藥指導卡




打開軟管蓋子



將塗藥器拴緊在軟管上



依所需的劑量壓入塗藥管內



將塗藥器旋開



先躺下後拉起膝蓋，將塗藥器輕輕插入陰道深部，再推動軟管將所有藥劑推入陰道內



使用後的塗藥器可將推管及容器管分開，用少許肥皂及溫水清洗