

非類固醇止痛消炎藥(Non-Steroidal Antiinflammatory Drugs)

主成份	商品名	中文名	含量
Celecoxib	Celebrex	希樂葆膠囊	200毫克/膠囊
Diclofenac sodium	Voren	非炎	50毫克/膠囊
Ibuprofen	Purfen	普服芬膜衣錠	400毫克/錠
Indomethacin	Indalgin	炎得淨	25毫克/膠囊
Naproxen	Proxen	柏拿舒	375毫克/錠

作用：

解熱、鎮痛、緩解發炎反應。

劑量與用法：

1. 口服藥品須以足量的開水(約250 毫升)吞服，服藥後15-30分鐘避免躺下。
2. 由於各個藥品作用時間長短不一，因此服藥間隔時間也不同。請切實遵照醫師處方服藥。
3. 此類藥品應伴隨食物併服，希樂葆 (Celebrex) 則可單獨服用。
4. 長效錠 (中文商品名中含有長效、緩釋、持續、持效等字樣) 須整粒吞服，不可研磨或剝半使用。
5. 栓劑太軟時，可置於冰箱 30 分鐘或冷水中，但鋁箔包裝不可拆。

注意事項：

1. 長期使用非類固醇止痛消炎藥者，開始使用三個月內需監測肝、腎功能與糞便潛血反應，其後每隔六至十二個月再測一次。對於高危險群的病人 (如老年人、肝、腎功能不佳、有潰瘍病史者)，開始使用的一個月內需監測一次肝、腎功能與糞便潛血反應，其後每隔三至六個月再測一次。
2. 少數病人服用此類藥品可能會覺得眩暈或嗜睡。在未確定此藥對您有何影響之前，請勿開車或操作危險機械。
3. 服藥期間應避免喝酒。
4. 對本類藥品或其他藥品過敏者，請先告知醫師。對磺胺類製劑過敏者禁用希樂葆 (Celebrex)。
5. 正在服用其他藥品者請先告知醫師。服藥期間，欲服用其他治感冒之止痛藥品 (特別是aspirin)，應告知醫師。
6. 如有心衰竭、高血壓、體液滯留、氣喘、胃腸道出血、嚴重血液異常、嚴重肝腎功能障礙、腎臟病等病史的病患，服用本藥前應告知醫師。
7. 孕婦及授乳婦用藥前應告知醫師。懷孕的後期，可能引起主動脈導管的早期癒合。應避免使用此類藥品。

8. 服藥期間，須進行拔牙或各類手術或併服可邁丁 (Coumadin) 時，應告知醫師。

9. 風濕疾病的治療，通常在服藥一至二週後方見效，請按時服藥。

忘記服藥時該怎麼辦？

1. 一天一次或兩次：一或二個小時內若記得應儘速服藥；若忘記時間已久則不用補服，仍按原時間服藥，不可一次服用雙倍量。

2. 一天服藥兩次以上：立即補服，若已接近下次服藥時間則不補服，仍按原時間服藥，不可一次服用雙倍量。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
嚴重暈眩、呼吸變快或不規則、心跳變快或不規則、臉部或腳部蕁麻疹腫漲、呼吸困難、胸悶	請立刻至急診就醫 (過敏反應)
嚴重腹部或胃灼熱或絞痛、黑便、胸痛、癲癇、發燒、不尋常出血、吐血	請立即就醫 (過量或嚴重副作用)
尿液變濁或排尿困難、喉嚨痛、頭痛、黃疸、急速體重增加、浮腫、眼皮腫	請儘速就醫
腹部不適、便秘、食慾變差、眼睛對光敏感度增加、睡眠不佳、體重減輕	若症狀持續請就醫

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

財團法人臺灣基督教門諾會醫院病患用藥教育單張 藥劑科製作 2009/11/26