

鼻噴劑正確使用方法

如何正確使用鼻噴劑:

- 請依醫師指示使用，不要使用過量或超過醫師指定的次數，以免增加副作用的發生機率。
- 使用前請先清潔鼻腔，用拇指壓住一邊鼻孔，將噴嘴插入另一邊鼻孔，頭稍向前傾，噴霧器保持垂直。
- 用手按壓噴嘴，用鼻吸入噴出之氣霧，再用口呼氣。
- 換手並在另一邊鼻孔重複整個程序。
- 即使自覺病情有改善，未與醫師諮商前，請勿隨意停藥。
- 請置於乾燥陰涼處及兒童不能接觸的地方。

藥品可能引起的副作用及處理方式:

- 可能出現鼻子與喉嚨之乾燥與刺激感，不適的味覺與氣味，若有過敏症狀(如眼睛發癢流)請告知醫師。

忘記用藥時該怎麼辦:

想起時儘快使用，若已接近下一次用藥時間則略過一次，依照原定時間用藥，絕不可一次使用雙倍劑量。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。
財團法人臺灣基督教門諾會醫院病患用藥教育單張，藥劑科製作 2009/11/24