

## Ergotamine Tartrate & Caffeine 錠

---

**主成份及含量:** Ergotamine tartrate 1 mg 和 Caffeine 100 mg

**商品名:** Ergocafe

**中文商品名:** 痛安錠

### **作用:**

血管性頭痛如偏頭痛、組織胺性頭痛。

### **劑量與用法:**

為達最好效果，在於症狀開始時即刻服用，且按照醫師指示或照藥袋上的指示，不明白的地方可請教醫師或藥師，不要使用過量，以免增加副作用的發生機率。使用方法如下：

1. 偏頭痛發生時，服用 2 錠。
2. 躺下且放鬆，於安靜、黑暗的房間中至少 2 小時。
3. 如果頭痛於 30 分鐘內未停止，可再服用1或2 錠。
4. 每 30分鐘服用1或2 錠，直至頭痛停止。除非醫師特別指示，24小時內最多不可服用超過6錠，1週內，最多不可服用超過10 錠。
5. 如果你已服用6錠，頭痛仍持續，請儘快就醫。
6. 若用於6-12歲小孩須減半使用。

### **注意事項:**

- 曾對此藥或其它藥物過敏者，請先告知醫師。
- 請先告知醫師目前正在使用的其他藥品（包括指示用藥與成藥），尤其是抗生素(erythromycin、troleandomycin)、降血壓類（nifedipine、prazosin、propranolol）、cocaine 或epinephrine針劑、麥角鹼類（包括子宮收縮劑-ergonovine、腦循環改善劑-ergoloid mesylates）、維他命或其他可能引起興奮、睡不著、口乾、暈眩、昏昏欲睡的藥品。
- 曾有心血管疾病、嚴重皮膚癢、循環不良、嚴重感染、腎或肝病等病史者，請先告知醫師。用藥期間，發生感染病時，請告知醫師。
- 懷孕或哺乳者請先告知醫師，服藥期間懷孕者也請告知醫師。
- 注意保暖，特別是年長者，避免常暴露於低溫中。因為此藥品會使末端循環下降，而使手腳冰冷。
- 如果於服藥後偏頭痛發生更頻繁，或藥效變差，這可能是對藥物產生依賴性，請勿試增加藥量。
- 飲酒會導致頭痛惡化或引發其他頭痛；抽煙會使此藥副作用增加。

### 忘記用藥時該怎麼辦？

本品僅為症狀解除之用，頭痛緩解即可不再服用。

### 此藥可能引起的副作用有那些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
腳無力；胸痛；心跳急；頭暈；抽搐或痙攣；手、腳、頸或肩肌痛或僵硬；皮膚癢或起水泡；手指、腳指冰冷、麻木和刺痛感；胃痛	請立即就醫
臉、手或腳腫脹	請儘速就醫
胃不舒服、嘔吐	嚴重或持續時，請告知醫師

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

財團法人臺灣基督教門諾會醫院病患用藥教育單張 藥劑科製作 2009/11/26