

步驟二、對於醫療方式的考量

請依照下列考量項目圈選，0分代表非常不在意，5分代表非常在意

考量項目	非常 不在意	1	2	3	4	5	非常 在意	如果這個理由對您非常重要，建議您可以考慮選擇的方案
接受治療的便利性	0	1	2	3	4	5		純口服化療藥物
接受治療後的效果	0	1	2	3	4	5		純口服化療藥物
接受治療的生活品質	0	1	2	3	4	5		純口服化療藥物
治療期間的不良反應	0	1	2	3	4	5		純口服化療藥物
其他考量	0	1	2	3	4	5		

步驟三、對於上面提供的資訊，您是否已經了解呢？

針劑靜脈輸注化療的治療方式作用快，需住院治療且有醫療人員隨時注意病人狀況？

☐是 ☐否 ☐不清楚

純口服化療藥物因為作用慢，所以即使沒吃對治療影響也不大？

☐是 ☐否 ☐不清楚

純口服化療藥物產生手足腫脹狀況較針劑靜脈靜脈注射高？

☐是 ☐否 ☐不清楚

步驟四、您確認好醫療方式了嗎？

我已經確認好想要的醫療方式，我決定選擇：

☐針劑靜脈輸注化療藥物

☐純口服化療藥物

我目前還無法決定

☐我想要再與主治醫師討論

☐我想要再與其他人(包含配偶、家人、朋友或第二意見提供者…)討論我的決定

☐對於以上醫療方式，我想要再瞭解更多，我的問題有：

文獻：

1. Gkretas I, Novotny J, Fabian P, et al. Deficient mismatch repair as a prognostic marker in stage II colon cancer patients. Eur J Surg Oncol 2019; 45:1854.

2. Baxter NN, Kennedy EB, Bergsland E, et al. Adjuvant Therapy for Stage II Colon Cancer: ASCO Guideline Update. J Clin Oncol 2022; 40:892.

3. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). NCCN clinical practice guidelines in oncology. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls

(Accessed on May 18, 2022).



臺灣基督教門諾會
醫療財團法人門諾醫院
Mennonite Christian Hospital

醫師診斷為

第二期大腸癌

我該如何選擇治療方式？



請掃描QR Code
填寫滿意度

前言

當醫師診斷為第二期大腸癌，一時之間對自己的未來感到徬徨，不知道會不會再復發，不知道自己應該接受何種治療？治療的選擇會為自己帶來多少不同的影響？應如何選擇才最適合自己呢？以下將依據自己的需求及所在意的事情，一步一步幫助您做出決策。

適用對象/適用狀況

經醫師確診為第二期大腸癌，手術後考慮是否接受化學治療者。

疾病或健康議題介紹

大腸癌有數種細胞型態，其中以腺癌為主約佔 95%。疾病的嚴重程度與您發現時腫瘤的細胞種類、大小與深度，及是否侵犯或擴散到周邊的淋巴結或其他器官有關。大腸癌病人接受臨床正規治療，第二期五年存活率為 66-76%。若及早治療相對存活率會增加。第二期大腸癌病人藥品治療目前健保部分有給付，亦有些治療需額外負擔藥品費用。

醫療選項介紹

經由檢驗檢查，確診您罹患大腸癌後，醫師會與您的治療方向取得共識，以下提供常見治療說明。第二期大腸癌一般以手術為主，仍有些病患需術後輔助性化療，以下提供兩個化療方案進行參考：



針劑靜脈輸注化療藥物

藉由人工血管將化療藥物直接輸注於血液作用於癌細胞，進而達到治療效果。

純口服化療藥物

藉由口服化療藥物方式，經胃腸吸收後作用於癌細胞，進而達到治療效果。

Q 您目前比較想要選擇的方式是？

- ☐ 針劑靜脈輸注化療藥物
- ☐ 純口服化療藥物
- ☐ 目前還不清楚



步驟一、選項的比較

選項 考量	針劑靜脈輸注化療藥物	純口服化療藥物
優點	1.無需每日服藥。 2.療程較短(半年)。 3.作用於血液。	1.簡單方便服用。 2.無侵入性疼痛。 3.無住院相關花費。
缺點	1.侵入性疼痛。 2.需裝置人工血管。 3.需注意過敏輸注反應。 4.需等待住院時間，有時無法準時接受注射。	可能忘記服藥或因不良反應導致服藥遵從性不佳。
要做的事	1.依規定時間入院執行療程。 2.住院相關花費和時間。 ★選擇針劑靜脈輸注化療，仍需注意自我健康照護及良好的生活習慣。	1.自我健康照護，例如：緩和運動(散步)、營養均衡，不食用未煮熟食物、定期回診抽血追蹤癌指數、依規定的時間服藥。 2.減少食用影響藥效食物，例如：葡萄柚或大量飲用葡萄柚汁。 3.注意自身胃腸狀況及良好的生活習慣。
不良反應	1.手腳紅腫疼痛狀況少。 2.白血球降低狀況較多。	1.白血球降低狀況少。 2.較有手腳紅腫疼痛狀況，影響生活品質。